

HOJA INFORMATIVA 2014

DATOS ESTADÍSTICOS MUNDIALES

Personas que viven con el VIH

- En 2013, 35 millones [33,2 millones–37,2 millones] de personas vivían con el VIH.
 - Desde el comienzo de la epidemia, aproximadamente 78 millones [71 millones–87 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH y 39 millones [35 millones–43 millones] de personas han fallecido a causa de enfermedades relacionadas con el VIH.

Nuevas infecciones por el VIH

- Los casos de nuevas infecciones por el VIH han descendido en un 38% desde 2001.
 - A nivel mundial, 2,1 millones [1,9 millones–2,4 millones] de personas contrajeron la infección por el VIH en 2013, en comparación con los 3,4 millones de casos registrados en 2001 [3,3 millones–3,6 millones].
- En los niños, las nuevas infecciones se han reducido en un 58% desde 2001.
 - A escala mundial, 240.000 niños [210.000–280.000] contrajeron la infección por el VIH en 2013, mientras que en 2001 la cifra ascendió hasta los 580.000 [530.000–640.000].

Muertes relacionadas con el sida

- Desde el pico alcanzado en 2005, los casos de muerte relacionados con el SIDA se han reducido en un 35%.
 - En 2013, fallecieron 1,5 millones de personas [1,4 millones–1,7 millones] en todo el mundo por causas relacionadas con el SIDA, frente a los 2,4 millones [2,2 millones–2,6 millones] registrados en 2005.

Terapia antirretrovírica

- En 2013, aproximadamente 12,9 millones de personas que vivían con el VIH tuvieron acceso a la terapia antirretrovírica.
 - Ello representa un 37% [35%-39%] de todas las personas que viven con el VIH.
 - Un 38% [36%-40%] de los adultos que viven con el VIH reciben actualmente el tratamiento que necesitan, mientras que tan solo un 24% [22%-26%] de los niños que viven con el VIH tienen acceso al mismo.

El VIH y la tuberculosis

- La cifra de muertes relacionadas con la tuberculosis en personas que viven con el VIH ha descendido en un 36% desde 2004.

- La tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte en las personas que viven con el VIH; se calcula que unas 320.000 personas [300.000–340.000] han fallecido en 2012 a causa de dicha enfermedad.
- En 2013, el porcentaje de pacientes seropositivos con tuberculosis que comenzaron o continuaron el tratamiento antirretrovírico fue del 70% (en comparación con el 57% registrado en 2012).

Inversión

- En 2013, se contó con 19.100 millones de dólares estadounidenses para la respuesta al SIDA.
 - En la actualidad, se estima que se necesitan entre 22.000 y 24.000 millones de dólares estadounidenses para 2015.
- En 2013, la inversión nacional de los países de ingresos medios y bajos constituyó cerca de la mitad del total de los fondos destinados al VIH.

DATOS ESTADÍSTICOS REGIONALES

África subsahariana

- En 2013, **24,7 millones [23,5 - 26,1 millones]** de personas vivían con el VIH en África subsahariana.
 - Las mujeres representan el **58%** del total de personas que viven con el VIH en África subsahariana.
- En 2013, se produjeron aproximadamente **1,5 millones [1,3 - 1,6 millones]** de nuevas infecciones por el VIH en África subsahariana.
 - Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un **33%** en el periodo de 2005 a 2013.
 - En la región de África subsahariana se concentra casi el **70%** del número total de nuevas infecciones por el VIH en todo el mundo.
- En 2013, **1,1 millones [1,0 - 1,3 millones]** de personas murieron por causas relacionadas con el SIDA en África subsahariana.
 - Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el SIDA descendió un **39%** en África subsahariana.
- La cobertura del tratamiento alcanza al **37%** de todas las personas que viven con el VIH en África subsahariana.
 - En 2013, el **67%** de los hombres y el **57%** de las mujeres no recibían tratamiento antirretrovírico (TAR) en África subsahariana.
 - **Tres de cada cuatro personas** que reciben TAR viven en África subsahariana.
 - **En Nigeria, el 80%** de las personas no tiene acceso al tratamiento.
- En 2013, se produjeron **210.000 [180.000 - 250.000]** nuevas infecciones por VIH en niños en África subsahariana.

- Desde 2009, ha habido una disminución del **43%** de nuevas infecciones por VIH entre los niños de los **21 países prioritarios** del Plan Mundial en África.

Asia y el Pacífico

- En 2013, **4,8 millones [4,1 - 5,5 millones]** de personas vivían con el VIH en Asia y el Pacífico.
- En 2013, se produjeron en la región aproximadamente **350.000 [250.000 - 510.000]** nuevas infecciones por el VIH.
 - Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un **6%** en el periodo de 2005 a 2013.
 - Indonesia preocupa especialmente: desde **2005**, las nuevas infecciones por el VIH han aumentado un **48%**.
- En Asia y el Pacífico, **250.000 [210.000 – 290.000]** personas murieron por causas relacionadas con el SIDA en 2013.
 - Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el SIDA en la región experimentó un descenso del **27%**.
 - En India se contabiliza el **51%** de todas las muertes relacionadas con el SIDA en la región.
- La cobertura del tratamiento llega al **33% [28 – 38]** de las personas que viven con el VIH en Asia y el Pacífico.
- En 2013, cerca de **2,4 millones** de varones adultos y **1,4 millones** de mujeres adultas no recibían TAR en Asia y el Pacífico.
 - Solo dos países de Asia y el Pacífico (Tailandia y Camboya) reúnen en la actualidad a más del 50 % de las personas que viven con el VIH y reciben tratamiento con medicamentos antirretrovíricos.
- En 2013, se produjeron **22.000 [18.000 - 32.000]** nuevas infecciones por VIH en niños en Asia y el Pacífico.
 - Desde 2009, se ha producido un descenso del **15%** del número de nuevas infecciones por el VIH en niños en la región.

América Latina

- En 2013, **1,6 millones [1,4 - 2,4 millones]** de personas vivían con el VIH en América Latina.
- En 2013, se produjeron en la región aproximadamente **94.000 [71.000 - 170.000]** nuevas infecciones por el VIH.
 - Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un **3%** en el periodo de 2005 a 2013.
- En 2013, **47.000 [39.000 - 75.000]** personas murieron por causas relacionadas con el sida en América Latina.

- Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el sida en la región experimentó un descenso del **31%**.
- La cobertura del tratamiento llega al **45% [33 – 51]** de las personas que viven con el VIH en América Latina.
- En 2013, se produjeron **1.800 [<1.000- 7.400]** nuevas infecciones por VIH en niños en América Latina.

Europa Occidental y Central y Norteamérica

- En 2013, **2,3 millones [2,0 - 3,0 millones]** de personas vivían con el VIH en Europa Occidental y Central y Norteamérica.
 - En Estados Unidos, se contabiliza el **56%** de las personas que viven con SIDA en esta parte del mundo.
- En 2013, se produjeron en la región aproximadamente **88.000 [44.000 - 160.000]** nuevas infecciones por el VIH.
- En Europa Occidental y Central y Norteamérica, **27.000 [23.000 - 34.000]** personas murieron por causas relacionadas con el sida en 2013.
 - Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el SIDA en la región experimentó un descenso del **2%**.
- La cobertura del tratamiento llega al **51% [39 – 60]** de las personas que viven con el VIH.
- En 2013, se produjeron **<500 [<200 - <500]** nuevas infecciones por VIH en niños en Europa Occidental y Central y Norteamérica.

Europa Oriental y Asia Central

- En 2013, **1,1 millones [980.000 - 1,3 millones]** de personas vivían con el VIH en Europa oriental y Asia central.
- En 2013, se produjeron en la región aproximadamente **110.000 [86.000 - 130.000]** nuevas infecciones por el VIH.
 - El número de nuevas infecciones por el VIH ascendió un **5%** desde 2005 hasta 2013.
- En Europa oriental y Asia central, **53.000 [43.000 - 69.000]** personas murieron por causas relacionadas con el SIDA en 2013.
 - Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el SIDA en la región experimentó un incremento del **5%**.
- La cobertura del tratamiento llega al **21% [18–24]** de las personas que viven con el VIH en Europa oriental y Asia central.
- En 2013, se produjeron **<1.000 [<1.000 – 1.200]** nuevas infecciones por VIH en niños en Europa oriental y Asia central.

El Caribe

- En 2013, **250.000 [230.000 – 280.000]** personas vivían con el VIH en la región del Caribe.
- En 2013, se produjeron en la región cerca de **12.000 [9.400 – 14.000]** nuevas infecciones por el VIH.
 - Las nuevas infecciones por el VIH descendieron un **40%** en el periodo de 2005 a 2013.
- En 2013, **11.000 [8.300 – 14.000]** personas murieron por causas relacionadas con el SIDA en la región del Caribe.
 - Entre 2005 y 2013, el número de **muerres relacionadas con el SIDA en la región se redujo a la mitad.**
 - En Haití, se registró el **59%** del total de muertes relacionadas con el SIDA en la región en 2013.
- La cobertura del tratamiento alcanza al **42%** de las personas de 15 años de edad o mayores que viven con el VIH en la región del Caribe, un **aumento del 31% desde 2011.**
- En 2013, se produjeron **<1.000 [<500 - <1.000]** nuevas infecciones por VIH en niños en el Caribe.

Oriente Próximo y Norte de África

- En 2013, **230.000 [160.000 - 330.000]** personas vivían con el VIH en Oriente Próximo y Norte de África.
- En 2013, se produjeron en la región aproximadamente **25.000 [14.000 - 41.000]** nuevas infecciones por el VIH.
 - Las nuevas infecciones por el VIH ascendieron un **7%** desde 2005 hasta 2013.
- En Oriente Próximo y Norte de África, **15.000 [10.000 - 21.000]** personas murieron por causas relacionadas con el SIDA en 2013.
 - Entre 2005 y 2013, el número de muertes relacionadas con el SIDA en la región experimentó un incremento del **66%**.
- La cobertura del tratamiento llega al **11% [8 – 16]** de las personas que viven con el VIH en Oriente Próximo y Norte de África.
- En 2013, tuvieron lugar **2.300 [1.500 – 3.400]** nuevas infecciones por VIH en niños en Oriente Próximo y Norte de África.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Personas que viven con el VIH	29,8 millones [28,1-31,9 millones]	30,7 millones [29,0-32,7 millones]	31,4 millones [29,7-33,3 millones]	31,8 millones [30,2-33,7 millones]	32,1 millones [30,5-34,0 millones]	32,4 millones [30,8-34,3 millones]	32,7 millones [31,2-34,6 millones]	33,1 millones [31,5-34,9 millones]	33,4 millones [31,8-35,2 millones]	33,8 millones [32,2-35,6 millones]	34,2 millones [32,5-36,2 millones]	34,6 millones [32,8-36,6 millones]	35,0 millones [33,2-37,2 millones]
Nuevas infecciones por el VIH (total)	3,4 millones [3,3-3,6 millones]	3,3 millones [3,1-3,5 millones]	3,1 millones [3,0-3,3 millones]	3,0 millones [2,8-3,2 millones]	2,9 millones [2,7-3,1 millones]	2,8 millones [2,6-3,0 millones]	2,7 millones [2,5-2,9 millones]	2,6 millones [2,4-2,8 millones]	2,5 millones [2,3-2,7 millones]	2,5 millones [2,3-2,7 millones]	2,4 millones [2,2-2,6 millones]	2,2 millones [2,0-2,5 millones]	2,1 millones [1,9-2,4 millones]
Nuevas infecciones por el VIH (adultos)	2,9 millones [2,7-3,0 millones]	2,7 millones [2,5-2,9 millones]	2,6 millones [2,4-2,7 millones]	2,4 millones [2,3-2,6 millones]	2,3 millones [2,2-2,5 millones]	2,2 millones [2,1-2,4 millones]	2,2 millones [2,1-2,4 millones]	2,2 millones [2,0-2,3 millones]	2,1 millones [1,9-2,3 millones]	2,1 millones [1,9-2,3 millones]	2,1 millones [1,9-2,3 millones]	2,0 millones [1,8-2,2 millones]	1,9 millones [1,7-2,1 millones]
Nuevas infecciones (niños)	580.000 [530.000 – 640.000]	580.000 [540.000 – 640.000]	580.000 [540.000 – 630.000]	570.000 [520.000 – 620.000]	550.000 [510.000 – 600.000]	520.000 [480.000 – 580.000]	490.000 [450.000 – 540.000]	460.000 [420.000 – 510.000]	400.000 [370.000 – 450.000]	360.000 [330.000 – 400.000]	330.000 [290.000 – 370.000]	270.000 [240.000 – 310.000]	240.000 [210.000 – 280.000]
Muertes relacionadas con el SIDA	2,0 millones [1,8-2,2 millones]	2,1 millones [2,0-2,4 millones]	2,3 millones [2,1-2,5 millones]	2,4 millones [2,2-2,6 millones]	2,4 millones [2,2-2,6 millones]	2,3 millones [2,1-2,5 millones]	2,2 millones [2,0-2,4 millones]	2,1 millones [1,9-2,3 millones]	2,0 millones [1,8-2,1 millones]	1,9 millones [1,8-2,1 millones]	1,8 millones [1,7–2,0 millones]	1,7 millones [1,5-1,8 millones]	1,5 millones [1,4-1,7 millones]
Personas con acceso al tratamiento									5,2 millones	7,4 millones	9,0 millones	10,6 millones	12,9 millones
Recursos (\$EE.UU)		3.800 millones	4.600 millones	5.700 millones	7.400 millones	8.800 millones	10.500 millones	14.600 millones	15.500 millones	15.600 millones	17.100 millones	18.900 millones	19.100 millones

Datos estadísticos regionales y mundiales de 2013 *

Región	Personas que vivían con el VIH en 2013		Nuevas infecciones por el VIH en 2013		Muertes relacionadas con el SIDA en 2013 (total)
	total	niños	total	niños	
África subsahariana	24.7 millones [23,5 millones– 26,1 millones]	2,9 millones [2,6 millones– 3,2 millones]	1,5 millones [1,3 millones– 1,6 millones]	210.000 [180.000– 250.000]	1,1 millones [1,0 millones– 1,3 millones]
Asia y el Pacífico	4,8 millones [4,1 millones– 5,5 millones]	210.000 [190.000– 270.000]	350 000 [250 000– 510 000]	22 000 [18 000– 32 000]	250 000 [210 000– 290 000]
América Latina	1,6 millones [1,4 millones– 2,1 millones]	35.000 [27 000– 54 000]	94.000 [71.000– 170.000]	1.800 [<1.000– 7.400]	47.000 [39.000– 75.000]
Europa Central y Occidental, y América del Norte	2,3 millones [2,0 millones– 3,0 millones]	2.800 [2.300– 3.600]	88.000 [44.000– 160.000]	<500 [<200– <500]	27.000 [23.000– 34.000]
Europa Oriental y Asia Central	1,1 millones [980.000– 1,3 millones]	14.000 [13.000– 14.000]	110.000 [86.000– 130.000]	<1.000 [<1.000– 1.200]	53.000 [43.000– 69.000]
El Caribe	250.000 [230.000– 280.000]	17.000 [14.000– 20.000]	12.000 [9.400– 14.000]	<1.000 [<500– <1.000]	11.000 [8.300– 14.000]
Oriente Medio y África septentrional	230.000 [160.000– 330.000]	16.000 [11.000– 22.000]	25.000 [14.000– 41.000]	2.300 [1.500– 3.400]	15.000 [10.000– 21.000]
Mundial	35 millones [33,2 millones– 37,2 millones]	3,2 millones [2,9 millones– 3,5 millones]	2,1 millones [1,9 millones– 2,4 millones]	240.000 [210.000– 280.000]	1,5 millones [1,4 millones– 1,7 millones]

*Es posible que algunas cifras no sean exactas, ya que se han redondeado

Contacto

Comunicaciones ONUSIDA | Tfl.: +41 22 791 1697 | communications@unaid.org

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para conseguir su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA. El ONUSIDA reúne los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados globales y nacionales para maximizar los resultados de la respuesta al sida. Acceda a más información en unaid.org y conecte con nosotros a través de Facebook y Twitter.