



إعرف المزيد عن

ب.ب

الوقاية بعد التعرض

صحتك هي مستقبلك

ما هي بَب؟

العلاج الوقائي بعد التعرض هو إجراء وقائي يستهدف الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة محتملة بفيروس نقص المناعة البشرية (في أي أتش).

بَب هو علاج يقلل من خطر الإصابة بالعدوى.

بَب يحمي فقط من فيروس نقص المناعة البشرية (في أي أتش)، الواقي الذكري أو الأنتوي هو أفضل وسيلة للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (في أي أتش) وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا.

من يمكنه أخذ بَب؟

الأشخاص غير المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية (في أي أتش) أو الذين لا يعرفون حالتهم المصلية و الذين قد يحتمل تعرضهم (في أي أتش).

ليس للاستخدام المنتظم إذا كان التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية متكررًا (في أي أتش)

كيف يتم أخذ البب؟

إنه نظام علاجي (أقراص) ضد فيروس نقص المناعة البشرية (في أي أتش) يتم تناوله لمدة 28 يوما.

-يوصى ببدء العلاج في أقرب وقت ممكن بعد التعرض المحتمل، ويفضل أن يكون ذلك خلال ال 24 ساعة الأولى و دائما خلال 72 ساعة الأولى .

أين تتقدم للحصول على البب؟

يمكن للأشخاص الذين يحتمل تعرضهم للإصابة (في أي أتش) أن يطلبوا بب في الإسعاف بالمستشفى .

يتم تضمين البب في نظام الصحة الوطني الإسبانية (SNS) وهي خدمة صحية مجانية في جميع أنحاء إسبانيا .



المزيد من المعلومات
عن إيب:

صحتك هي مستقبلك



Salud Entre
Culturas

Asociación para el Estudio de las
Enfermedades Infecciosas

بدعم من:



Comunidad
de Madrid

Dirección General de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SANIDAD



CONOCE MÁS SOBRE LA

PPPE

Profilaxis posexposición

TU SALUD ES TU FUTURO

¿QUÉ ES LA PPE?

La profilaxis posexposición es una medida preventiva dirigida a personas que han tenido una posible exposición al VIH.

La PPE es un tratamiento que reduce el riesgo de que se produzca la infección.

**La PPE solo protege frente al VIH.
El preservativo es la mejor herramienta para
prevenir el VIH y otras infecciones de
transmisión sexual.**

¿QUIÉN PUEDE TOMAR PPE?

Personas sin VIH o que desconocen su estado serológico y que han tenido una posible exposición al VIH.

No es para uso regular si la exposición al VIH es frecuente.

¿CÓMO SE TOMA LA PPE?

Es una pauta de tratamiento (comprimidos) frente al VIH que se toma durante 28 días.

Se recomienda iniciar el tratamiento cuanto antes tras la posible exposición: preferiblemente en las primeras 24 horas y siempre dentro de las primeras 72 horas.

¿DÓNDE SE SOLICITA LA PPE?

Las personas que hayan tenido una posible exposición al VIH pueden solicitar la PPE en cualquier servicio de urgencias de un centro hospitalario.

La PPE está incluida dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) y es una prestación sanitaria gratuita en todo el territorio español.

+ Info sobre PPE:



TU SALUD ES TU FUTURO



**Salud Entre
Culturas**

Asociación para el Estudio de las
Enfermedades Infecciosas

Subvencionado por:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD


DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA

DIVISIÓN DE CONTROL
DE VIH, ITS, HEPATITIS VIRALES
Y TUBERCULOSIS



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SANIDAD



EN SAVOIR PLUS SUR LA

PPPE

Prophylaxie post-exposition

VOTRE SANTÉ C'EST VOTRE AVENIR

QU'EST-CE QUE LA PPE ?

La prophylaxie post exposition est une mesure préventive dirigée aux personnes qui ont été exposées à une possible infection au VIH.

La PPE est un traitement qui réduit le risque que l'infection se produise.

La PPE protège uniquement contre le VIH. Le préservatif est la meilleure protection contre le VIH et d'autres infections sexuellement transmissibles.

QUI PEUT PRENDRE LA PPE ?

Des personnes sans VIH ou qui ne connaissent pas leur situation sérologique et qui ont potentiellement été exposées au VIH.

Ne pas utiliser régulièrement si l'exposition au VIH est fréquente.

COMMENT PRENDRE LA PPE ?

Il s'agit d'un traitement (comprimés) contre le VIH qui se prend pendant 28 jours.

Il est recommandé de commencer le traitement le plus tôt possible après une éventuelle exposition : de préférence dans les premières 24 heures et toujours dans les 72 heures.

OÙ PEUT-ON DEMANDER LA PPE ?

Les personnes ayant possiblement été exposées au VIH, peuvent demander la PPE dans n'importe quel service d'urgence d'un centre hospitalier.

La PPE est comprise dans le Système national de Santé espagnol (SNS) et c'est une prestation sanitaire gratuite sur tout le territoire espagnol.

+ Info sur PPE:



VOTRE SANTÉ C'EST VOTRE AVENIR



Subventionné par:



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SANIDAD



LEARN MORE ABOUT

PEEP

Post-exposure prophylaxis

YOUR HEALTH IS YOUR FUTURE

WHAT IS PEP?

Post-exposure prophylaxis is a preventive measure for people who have had a possible exposure to HIV.

PEP is a treatment that reduces the risk of infection.

PEP only protects against HIV. Condoms are the best tool to prevent HIV and other sexually transmitted infections.



WHO CAN TAKE PEP?

People without HIV and people who do not know their HIV status can take PEP if they have had a possible exposure to HIV.

It is not for regular use if HIV exposure is frequent.

HOW TO TAKE PEP?

PEP is a course of HIV medication (pills) taken for 28 days.

It is recommended to start treatment as soon as possible after a possible exposure: preferably within 24 hours and always within 72 hours.

WHERE TO GET PEP?

People who have had a possible exposure to HIV can request PEP from any hospital emergency department.

PEP is included in the Spanish National Health System (SNS) and is a free health service throughout Spain.

+ Info about PEP:



YOUR HEALTH IS YOUR FUTURE



Supported by:



MINISTERIO
DE SANIDAD

SECRETARÍA DE ESTADO
DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL
DE SALUD PÚBLICA

DIVISIÓN DE CONTROL
DE VIH, ITS, HEPATITIS VIRALES
Y TUBERCULOSIS



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SANIDAD