

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2432>

Percepción al riesgo sexual en jóvenes: Revisión integrativa

Sexual risk perception in young people: An integrative review

Ana Sandoval

Rozio1526@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4547-1394>

Universidad Autónoma de Sinaloa

Los Mochis – México

Rosario Apodaca

eduardoapodaca@uas.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-8144-3457>

Universidad Autónoma de Sinaloa

Los Mochis – México

Gustavo Gómez

gustavogomez@uas.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0002-3034-5443>

Universidad Autónoma de Sinaloa

Los Mochis – México

Artículo recibido: 12 de julio de 2024. Aceptado para publicación: 26 de julio de 2024.

Conflictos de Interés: Ninguno que declarar

Resumen

A pesar de que la pandemia del VIH ha sido considerada una prioridad política mundial y un problema de salud con consecuencias devastadoras desde 1981, sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública del mundo y su transmisión persiste en todos los países, la deficiencia en los conocimientos y las prácticas sexuales de riesgo potencian la infección entre los jóvenes. La percepción de riesgo es la capacidad que tiene el individuo de actuar y asumir actitudes de protección ante situaciones que le pueden originar algún problema de salud. Por lo tanto, la presente revisión tiene como objetivo analizar la literatura científica disponible sobre la percepción al riesgo sexual que tienen los jóvenes; la investigación se realizó utilizando la metodología de Toronto, utilizando palabras claves en bases de datos: Pubmed, Google Académico y Scielo. El trabajo permitió tener una perspectiva más amplia respecto a la percepción al riesgo sexual en jóvenes. Como resultado se encontró que los jóvenes tienen baja percepción al riesgo sexual, en lo que respecta al sexo los hombres presentaron mayor percepción comparado con las mujeres. Los jóvenes perciben como riesgo sexual la actividad sexual descuidada, tener muchas parejas sexuales, consumo de sustancias ilícitas y alcohol.


Palabras clave: percepción, riesgo sexual, jóvenes

Abstract

Although the HIV pandemic has been considered a global political priority and a health problem with devastating consequences since 1981, it remains one of the world's main public health problems and its transmission persists in all countries, deficiency in Knowledge and risky sexual practices increase infection among young people. Risk perception is the ability of the individual to act and assume protective attitudes in situations that may cause a health problem. Therefore, the present review aims to analyze the available scientific literature on young people's perception of sexual risk; The research

was carried out using the Toronto methodology, using keywords in databases: Pubmed, Google Scholar and Scielo. The work allowed us to have a broader perspective regarding the perception of sexual risk in young people. As a result, it was found that young people have low perception of sexual risk, with regard to sex, men presented a higher perception compared to women. Young people perceive careless sexual activity, having many sexual partners, consumption of illicit substances and alcohol as sexual risk.

Keywords: perception, sexual risk, young people

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons . 

Cómo citar: Sandoval, A., Apodaca, R., & Gómez, G. (2024). Percepción al riesgo sexual en jóvenes: Revisión integrativa. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 5 (4), 2480 – 2489. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i4.2432>

INTRODUCCIÓN

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un virus que ataca el sistema inmunitario debilitando los sistemas de defensa contra las infecciones, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es la fase más avanzada de la enfermedad. Se transmite a través de los líquidos corporales de las personas infectadas, como sangre, leche materna, semen y secreciones vaginales (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). La pandemia del VIH/sida ha sido considerada una prioridad política mundial y un problema de salud con consecuencias devastadoras desde 1981, cuando se descubrieron los primeros casos de sida en California y Nueva York (López et al., 2018). De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los jóvenes siguen siendo los más afectados por el sida [(Programa Conjunto de las Naciones Unidas Contra el Sida (ONUSIDA, 2024)].

El VIH/sida sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública del mundo y su transmisión persiste en todos los países, y en algunos las nuevas infecciones están aumentando, cuando antes estaban en descenso. Además, en el año 2022 se presentaron 630.000 fallecimientos por causas relacionadas con el VIH/sida y 1.3 (de 1.0 a 1.7) millones contrajeron el virus (OMS, 2023). Cabe resaltar que el sida se ha convertido en un problema grave, siendo una de las principales causas de muerte entre personas de 25 y 34 años, en las cuales el número de casos causados por contacto sexual ha aumentado significativamente, esto significa que el momento de la infección es en la etapa de la juventud (Bretón- López & Buena-Casal, 2005).

El riesgo de adquirir VIH no siempre es tomado en cuenta por los jóvenes o su conocimiento no siempre induce prácticas preventivas. Ellos conforman una comunidad, comparten lugares, preferencias y vivencias en común y los años de vida universitaria representan una etapa crucial en la formación y ajuste de hábitos saludables (Duarte-Anselm et al., 2022). De acuerdo con Shiferaf et al., (2014) y Rodríguez et al., (2019) los jóvenes son más vulnerables a contraer una infección de transmisión sexual (ITS).

La deficiencia en los conocimientos y las prácticas sexuales de riesgo potencian el riesgo de la infección entre los jóvenes (Ceballos et al., 2022). Practicar conductas sexuales de riesgo favorece la presencia de peligros que comprometen la salud sexual y reproductiva, además de su desarrollo psicológico y social (Figueroa et al 2020). Se considera una conducta sexual de riesgo aquella que puede provocar resultados perjudiciales derivados de la actividad sexual tales como: tener sexo sin protección/ anticonceptivos; sexo como profesión; mantener relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol/drogas; tener sexo con múltiples parejas; participar del sexo casual; y practicar sexo con un compañero con ITS (Rodríguez & Becerra, 2022; Rojas & Castrejon, 2020).

Estudios coinciden en que la baja percepción de riesgo que presentan los y las jóvenes en relación con las infecciones de transmisión sexual hace posible que se expongan constantemente a riesgos que provocan daños a la salud (Arminda & Suárez, 2019; Estrella et al., 2022). La percepción de riesgo es la capacidad que tiene el individuo de actuar y asumir actitudes de protección ante situaciones que le pueden originar algún riesgo (Llanuris et al., 2023; Delgadillo et al., 2020). Además, las percepciones que se crean alrededor de temáticas sexuales son un punto clave para entender como las personas ejercen y viven su sexualidad (Rodríguez et al., 2019).

Por las consideraciones anteriores, se fundamenta la necesidad de realizar una revisión integrativa de la literatura que aborde la percepción al riesgo sexual en los jóvenes, que permita establecer una postura actualizada sobre la evidencia disponible y con ello implementar estrategias objetivas que ayuden a aumentar la percepción al riesgo sexual en este grupo poblacional.

METODOLOGÍA

La presente revisión integrativa se realizó de septiembre del 2023 a abril del 2024.

Se utilizaron las siguientes bases de datos; Pubmed, Google Académico y Scielo, utilizando filtro de fechas de la base de datos con intervalo de 2011 al 2023. En los que se incluyeron artículos en español, inglés y portugués. Se incluyeron términos claves como Percepción, Perception, sexo inseguro, unsafe sex, riesgo sexual, sexual risk, young people, youths y jóvenes. Se utilizaron sinónimos y conectores como "AND" "OR" y NOT. Los criterios de inclusión de artículos fueron los siguientes: publicados del 2011-2023; encontrados en las bases de datos seleccionadas; artículos en español; inglés y portugués que incluyeron a jóvenes. Los criterios de exclusión fue literatura gris.

Para la realización de la revisión integradora (RI), se siguieron los pasos de Toronto & Remington (2020). Para verificar que los estudios cumplieran con los criterios de inclusión, se realizó la lectura de los artículos donde se le dio análisis a los títulos, resúmenes y lectura completa sobre percepción al riesgo sexual, además se evaluó calidad metodológica de los estudios con la lista de verificación de Joanna Briggs Institute (JBI). Con base en la búsqueda de la literatura, se recuperaron en un primer momento 60 estudios. Posteriormente, de acuerdo con los criterios de inclusión se mantuvieron 11 de tipo cuantitativos, cualitativos y mixtos del 2011 al 2022, presentado en el diagrama PRISMA (figura 1) y para la extracción de la información se elaboró una tabla de extracción de los artículos seleccionados (Tabla 1)

Tabla 1

Autores/ Año	Método	Muestra	Resultado
Rodríguez et al., 2019	Cuantitativo	264 personas de 15 a 24 años	El (57 %) de los encuestados consideró no tener probabilidad de adquirir VIH.
Ceballos Rojas et al. 2022.	Cuantitativo	163 jóvenes estudiantes	EL (60.51 %) refieren no representar el tipo de persona que pueden contraer el VIH.
Llanes et al. 2022.	Cuantitativo	60 estudiantes	Presentan bajo índice de gravedad percibida (86,7 %), porcentajes superiores en el sexo masculino que en el femenino: 92.9 % y 81.2 %, respectivamente. La percepción de riesgo sobre VIH/sida fue baja 86.7 %; porcentajes superiores en el sexo femenino que en el masculino: 90.6 y 82.1 % respectivamente.
Price et al., 2018.	Cuantitativo	250 jóvenes	El 26 % que desconocían su estado serológico reportaron una alta percepción al VIH. La presencia de más factores de riesgo se asoció con mayor percepción.
Vergès et al., 2019	Cualitativo	28 adolescentes	En cuanto a la percepción de riesgo, los factores de riesgo identificados por ellos se relacionan con actividad sexual descuidada, es decir, sin métodos anticonceptivos, no uso de preservativos, tener muchas parejas sexuales, consumo de sustancias ilícitas y alcohol, y no cumplir con la terapia antirretroviral (TAR).

Extracción de resultados de los artículos seleccionados

Tabla 2

Extracción de resultados de los artículos seleccionados

Autores/ Año	Método	Muestra	Resultado
Rodríguez & Becerra, 2022.	Mixto	60 personas	La población masculina percibe mayor riesgo de contagio que las mujeres. El uso del preservativo fue el método percibido como más seguro, tanto en hombres (96.66%) como en mujeres (100%). Otro de los hallazgos relevantes es que 8 (26.66%) hombres y 8 (26.66%) mujeres en alguna ocasión tuvieron percepción de haber contraído VIH a través de una práctica sexual insegura.
Ferrer-Urbina et al., 2022.	Cuantitativo	1037 jóvenes	La mayoría considera que podría no contraer VIH (78%). Sin embargo, un porcentaje importante (35%) no considera la posibilidad de ser portador de VIH.
Duarte-Anselmi et al., 2022	Cualitativo	20 jóvenes	Las/os estudiantes solo reconocen a los homosexuales en su identidad masculina, estigmatizándolos como grupos de riesgo y excluyendo a otras identidades como lesbianas y transexuales.
Adedeji et al. 2011.	Cuantitativo	2006 estudiantes	Hubo diferencias significativas en la percepción entre los estudiantes de tres países: el 40% de las estudiantes estadounidenses, el 25.8% de las turcas y el 54.3% de las sudafricanas informaron que consideraban que tenían una probabilidad moderada a buena de infectarse por el VIH.
Staliano & Lapa., 2011.	Cuantitativo	137 estudiantes	54.7% de los estudiantes afirmó no tener riesgo de contraer el virus VIH y el 19.7% respondió que no le preocupa contraer SIDA. Sin embargo, el 15.3% afirmó no saber cómo protegerse contra VIH


Tabla 3

Extracción de resultados de los artículos seleccionados

Autores/ Año	Método	Muestra	Resultado
Kamire et al. 2022.	Cuantitativo	Mujeres jóvenes de 15 a 24 años.	El 13% presentó alta percepción de riesgo y el 14% no percibió nivel de riesgo. La percepción del riesgo de VIH aumentó con el número de factores de riesgo de infección por VIH. Sólo el 12.0% informaron tener un alto riesgo percibido de infección por VIH.

Figura 1

Diagrama de flujo, 2022



RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados expuestos anteriormente, los jóvenes en su mayoría presentan baja percepción al riesgo sexual, esto podría ser atribuido a que se comparte información insuficiente referente a la salud sexual y esta a su vez es de suma importancia ya que, ayuda a defenderse del riesgo (López et al., 2018; Badillo-Viloria et al., 2020), además, esta etapa se caracteriza por su iniciación, estructuralmente promiscua, débilmente premeditada, condicionada en muchos casos desde reglas marcadas por su grupo de amigos (Vidal & Hernández, 2017; López et al., 2020), respecto al sexo se encontró que los hombres presentan más alta percepción al riesgo sexual que las mujeres, estos datos coinciden con los de Juárez-Moreno et al., (2021), que menciona que a las mujeres les resulta difícil hablar estos temas con sus familiares, principalmente su pareja, lo cual puede incidir en que tengan control sobre su salud sexual y reproductiva.

La presencia de más factores de riesgo se asoció con mayor percepción, resultados evidenciados también por el estudio de Pereira & Tullo, (2017) que menciona que tener presente en mayor medida los riesgos sexuales ayuda a evitar conductas sexuales que los ponen en peligro. Esto podría estar atribuido a que las personas crean su propia realidad y evalúan los riesgos en función de sus percepciones subjetivas. Otro dato es que los jóvenes no perciben la gravedad real de la infección, esto podría deberse a que esta población no tiene los conocimientos necesarios para mirar la magnitud del problema o realizan actividades sexuales regularmente bajo influencia de alcohol y/o drogas y por consecuencia, no se perciben en riesgo (Jiménez et al., 2011), las mujeres con factores de riesgo no

se percibieron así misma como de alto riesgo esto pudiera deberse a que carecen de información y por ende ignoran algunas situaciones que les pueden ocasionar riesgos sexuales que se deben tener para evitar la transmisión y el curso del virus (Salazar et al., 2017; Cruz et al., 2023).

Los factores de riesgo más identificados fueron: no utilizar preservativo, de acuerdo con Bolaños (2019), los roles en función del género también contribuyen a que se adopten comportamientos que aumentan el riesgo del VIH o inhiben la acción preventiva. Otro dato importante es que los jóvenes refieren tener múltiples parejas sexuales, consumo de sustancias ilícitas y alcohol, datos referidos en el estudio de (Cañar & Vintimilla, 2023). Además, la percepción del riesgo de VIH aumentó con el número de factores de riesgo de infección por VIH, Cruz et al., (2023), refieren los jóvenes cuando más presente tienen el riesgo de contraer VIH en una relación desprotegida, utilizan mayormente el condón, esto podría ser debido a la susceptibilidad percibida, que plantea que los individuos varían ampliamente en sus sentimientos de vulnerabilidad personal a una condición; la severidad percibida, que se refiere a los sentimientos relativos a la seriedad de contraer una enfermedad (Santisteban et al., 2016).

CONCLUSIÓN

Se concluye que los jóvenes de manera general no presentan percepción alta al riesgo sexual y por consecuencia, no adoptan conductas sexuales seguras, la población masculina presentó mayor percepción, además, la presencia de más factores de riesgo en los jóvenes se asoció con mayor percepción. Poniéndose en manifiesto que ellos son población vulnerable y por lo tanto practican conductas sexuales de riesgo, tienen mayor probabilidad de adquirir una infección de transmisión sexual. Por tal motivo es sustantivo seguir realizando investigaciones que recopilen la mayor evidencia científica que coadyuve a tener herramientas para actuar ante esta problemática, y por ende poder establecer mejores estrategias de apoyo a esta población mediante el uso de la evidencia actualizada y con certeza de los posibles resultados.

REFERENCIAS

Adedeji, A., Tititlayo, C., Joseph, A., Seyi, L., Jose, F., y Yavuz, Y. (2011). Percepción de riesgo de VIH y conductas sexuales de riesgo entre estudiantes de Estados Unidos, Turquía y Sudáfrica. SAHARA: Revista de aspectos sociales de la Alianza para la Investigación del VIH/SIDA , 8 (1), 19-26.

Arminda, T, B. M., & Suárez, E, Á. (2019). La educación de la percepción de riesgo en la prevención de ITS/VIH-sida. Varona. Revista Científico Metodológica, (69).

Badillo-Viloria, M., Mendoza-Sánchez, X., Vásquez, M. B., & Díaz-Pérez, A. (2020). Comportamientos sexuales riesgosos y factores asociados entre estudiantes universitarios en Barranquilla, Colombia, 2019. Enfermería Global, 19(3), 422-449.

Bolaños. M. (2019). Barriers to access and use of the condom from a gender perspective. Horizonte sanitario, 18(1), 67-74.

Bretón-López, J., Buela, G. (2005). Evaluación del efecto de las campañas publicitarias de prevención de VIH/SIDA en adolescentes Psicothema, vol. 17, núm. 4, pp. 590-596

Cañar, R, A.S., & Vintimilla, E, M. J. (2023). Conductas sexuales de riesgo entre estudiantes universitarios [Versión 1; Revisión por pares - En curso]. <https://revista.saludcyt.ar/ojs/index.php/sct/article/view/256/462>

Ceballos, R., M. A., Hernández-García, F., Delgado, M, L., Romero, L. (2022). Conocimientos y percepción de riesgo de estudiantes de Estomatología frente al VIH/sida. Revista Cubana de Educación Médica Superior, 36(1), 1-16.

Cruz, J, M. J., Ulloa, W, T., & Bustamante, T, F. (2023). Percepciones de riesgo respecto a la transmisión de VIH/sida en estudiantes de Universidad de Chile. Edumecentro, 15.

Cruz, J, María José, Ulloa Wood, Tamara, & Bustamante Toncio, Francisco. (2023). Percepciones de riesgo respecto a la transmisión de VIH/sida en estudiantes de Universidad de Chile. EDUMECENTRO, 15. Epub 30 de noviembre de 2023. Recuperado en 04 de junio de 2024, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742023000100107&lng=es&tlng=es.

Delgadillo, L, L. M., Cortaza, R, L., & Calixto, M. G. (2020). Percepción de riesgo y consumo de alcohol y tabaco en estudiantes de una preparatoria en Zacatecas. Lux Médica, 15(43), 13-24.

Duarte-Anselmi, G., Leiva-Pinto, E., Vanegas-López, J., & Thomas-Lange, J. (2022). Experiencias y percepciones sobre sexualidad, riesgo y campañas de prevención de ITS/VIH por estudiantes universitarios. Diseñando una intervención digital. Ciência & Saúde Coletiva, 27, 909-920.

Estrella, L, B. C., Saa, S, B. F., & Caicedo, R, J. O. (2022). Propuesta educativa para mejorar la percepción de riesgo de contagio del VIH en estudiantes universitarios. Conrado, 18(87), 200-208.

Ferrer-Urbina, R., Sepúlveda-Páez, G., & Mena-Chamorro, P. (2022). Caracterización de Conductas Asociadas a VIH en Jóvenes y Adultos del Norte de Chile. Psykhe (Santiago), 31(2), 1-36.

Figuroa, L. A, Santillano Cárdenas, I., Figuroa Pérez, L., Rodríguez González, A. E., & García, B, L. (2020). Prevención de las conductas sexuales de riesgo en adolescentes del municipio Consolación del Sur. Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río, 24(4).

Jiménez, R. A., Jiménez, G. F., Tenahua, Q. I., & Grajales, A. I. (2011). Nivel de conocimientos de los adolescentes sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. *Enfermería universitaria*, 8(3), 13-20.

Juárez-Moreno, M., López-Pérez, O., Raesfeld, L. J., & Durán-González, R. E. (2021). Sexualidad, género y percepción del riesgo a la infección por VIH en mujeres indígenas de México. *Saúde e Sociedade*, 30, e200399.

Kamire, V., Magut, F., Khagayi, S., Kambona, C., Muttai, H., Nganga, L., & Joseph, R. H. (2022). HIV risk factors and risk perception among adolescent girls and young women: results from a population-based survey in western Kenya, 2018. *JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes*, 91(1), 17-25.

Llanes, L. G., José Martín, M. P., & Raisel, G. P. (2023). Programa educativo para modificar percepción de riesgo del VIH/sida en estudiantes de Medicina. *EDUMECENTRO*, 15.

López, D., Rodríguez, A.M., y Peña, M. (2020). Conductas sexuales de riesgo para infecciones de transmisión sexual en adolescentes. *Novedades en Población*, 16(31), 187-199. <http://www.novpob.uh.cu>

López, V., Troya, G., Varas, N., & Guzmán, M. (2018). Algunas consideraciones sobre el VIH/SIDA. *Revista Científica Mundo de la Investigación y el Conocimiento*, 2(4), 48-69.

OMS (2023). VIH y SIDA. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids?gclid=CjwKCAjwvfm0BhAwEiwAG2tqzFC8Zm2pAwwwDqqXAC4NEWaD buWS6eVC8twjw2ammLaFJgd9FKaLCRoCgDcQAvD_BwE

ONUSIDA (2024). Un nuevo informe de ONUSIDA demuestra que el sida puede acabar antes del 2030 y describe el camino para conseguirlo. <https://www.unaids.org/es/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2023/july/unai ds-global-aids-update#:~:text=Alrededor%20de%209%2C%20millones,VIH%20cada%20semana%20en%202022.>

Pereira, P. L., & Tullo, E. (2017). Percepción de riesgo ante eventos de salud urbana en trabajadores de epidemiología en Paraguay. *Revista de Comunicación y Salud: RCyS*, 7(1), 61-79.

Price, J.T, Rosenberg, N. E, Vansia, D., Phanga, T., Bhushan, N. L, Maseko, B., ... y Pettifor, A. (2018). Predictores del VIH, percepción del riesgo de VIH y preocupación por el VIH entre las adolescentes y mujeres jóvenes en Lilongwe, Malawi. *JAIDS Revista de síndromes de inmunodeficiencia adquirida*, 77 (1), 53-63.

Rodríguez Pérez, L. F., & Becerra Hernández, A. (2022). Percepciones asociadas a conductas sexuales de riesgo. *Horizonte sanitario*, 21(2), 292-298.

Rodríguez, M, A., Martínez Hernández, B., Prieto López, R., Rodríguez Muñoz, M., & Torrado Plasencia, G. E. (2019). Conocimientos sobre VIH en personas de 15 a 24 años. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 35(1).

Rojas, M, O. L., & Castrejono, C, J. L., (2020). El inicio de la vida sexual en México: Un análisis de los cambios en el tiempo y las diferencias sociales. *Revista Latinoamericana de Población*, 14(27), 77-114.

Salazar, J. A. A., Sánchez, C. E., & Marín, A. C. P. (2017). Representaciones sociales de los adolescentes acerca del riesgo de contraer VIH. *Archivos de Medicina*

Santiesteban, L., Pereda, M. P., Pérez, Y. M., Estrada, L. P., & Osorio, G. G. (2016). Percepción de Riesgo ante el VIH/sida en adolescentes del municipio Bartolomé Masó. *Multimed*, 20(1), 132-147.


Shiferaw, Y., Alemu, A., Assefa, A., Tesfaye, B., Gibermedhin, E., & Amare, M. (2014). Perception of risk of HIV and sexual risk behaviors among University students: implication for planning interventions. *BMC research notes*, 7(1), 1-8.

Staliano, P., & Lapa, A. E. C. (2011) Conhecimentos, atitudes e percepção de risco dos acadêmicos de fonoaudiologia perante a AIDS. *Psicol rev.* 17 (1): 100-16.

Toronto, C. E., & Remington, R. (Eds.). (2020). A step-by-step guide to conducting an integrative review. *universitaria*, 8(3), 13-20.

Vergês, V., Chávez, A., González, C., Pacheco, P., & Gómez, R. (2019). Creencias, percepciones y experiencias en sexualidad de adolescentes chilenos con infección por VIH adquirida por transmisión vertical. *Revista chilena de infectología*, 36(3), 318-330.

Vidal, B. E., & Hernández González, B. (2017). Conductas sexuales de riesgo asociadas a las infecciones de transmisión sexual en adolescentes de una comunidad. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 16(4), 625-634.

Todo el contenido de **LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades**, publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia [Creative Commons](#) .