

Traitement
VIH



Prep



Préservatifs



Dépistage



Réduction
des risques



Traitement
d'urgence



CONTRE LE VIH
UN ÉVÉNEMENT
DE POSSIBILITÉS

AIDES
DE POSSIBILITÉS
Plus

Association Française
pour le SIDA
et les maladies
sexuellement
transmissibles

Traitement d'urgence

Pour éviter une contamination au VIH, le traitement d'urgence, aussi appelé traitement post-exposition (TPE), doit être pris dans les 4 heures (idéalement) ou dans les 48 heures (au plus tard) après un risque de transmission. Le TPE est disponible à l'hôpital et parfois en risque de dépistage (Cegidd). Pour trouver le TPE le plus proche, rendez-vous sur sida-info-service.org ou appelez le 0 800 840 800.



Réduction des risques

La réduction des risques liés à l'usage de drogues est un ensemble de pratiques permettant notamment d'éviter la transmission du VIH, et des hépatites B et C : distribution de matériel à usage unique (carnets « roule ta paille », seringues, etc.), séances d'accompagnement à l'injection, etc. Dispositif d'écoute et de soutien pour le Chemsex sur WhatsApp et Signal (07 62 93 22 29), sur Telegram (AIDESChemsex) et sur Facebook (groupe Info Chemsex).

Dépistage

Le dépistage régulier du VIH permet de connaître son statut sérologique afin de pouvoir se soigner et protéger ses partenaires. Pour cela, choisissez la méthode qui vous convient le mieux : test classique en centre de dépistage (Cegidd) ou en laboratoire (gratuit même sans ordonnance), test rapide réalisé par les associations, autotest (vendu en pharmacie ou distribué gratuitement par AIDES).



Préservatifs

Les préservatifs (internes et externes), lorsqu'ils sont correctement utilisés, permettent d'éviter d'attraper le VIH ainsi qu'un certain nombre d'infections sexuellement transmissibles (IST). Il existe des préservatifs de différentes tailles et/ou matières, certains sont même remboursés par la sécurité sociale. AIDES met à disposition des préservatifs gratuitement dans toutes ses actions.



Prep



La Prep est un médicament à prendre de façon préventive pour éviter d'attraper le VIH, même lors de rapports sexuels sans préservatif. C'est très efficace et entièrement pris en charge. Pour en bénéficier, prenez rendez-vous auprès de votre médecin traitant ou dans un Cegidd, et assurez-vous d'avoir un suivi régulier. Pour un savoir plus : aides.org/prep ou groupe Facebook Prep/Dial.



Traitement VIH

Lorsque les personnes vivant avec le VIH prennent leur traitement tel que prescrit, la quantité de virus dans leur corps devient tellement faible qu'on parle de « charge virale indétectable ». Or, des preuves cliniques ont établi que les personnes ayant une charge virale indétectable ne peuvent pas transmettre le VIH. Rendez-vous dans un local de AIDES ou sur seronet.info pour en parler.

Création : Fabrice - johnsonandjohnson.com

RDV SUR AIDES.ORG
POUR CONNAÎTRE LE LOCAL DE AIDES LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS,
VENEZ VITE NOUS RENCONTRER !
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR VOLONTAIRE ET NOUS AIDER À PRÉVENIR CES OUTILS DE
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

Rédaction : Agence de communication graphique de Saint Adolphe France