


DATOS SOBRE LA MUESTRA


Nº total de personas que se han realizado la prueba rápida: 243

Distribución por sexo




Las mujeres tienen una menor percepción del riesgo, aún siendo más vulnerables frente a la infección por VIH

Distribución por edad



Distribución por procedencia



Prácticas de riesgo referidas




Los resultados de las pruebas rápidas realizadas en este estudio son de un alto grado de fiabilidad, ya que el 81% de los usuarios que se han sometido a la misma habían superado el periodo ventana.

Tiempo transcurrido desde la última práctica de riesgo



Relaciones sexuales bajo efectos de sustancias

Bajo los efectos de sustancias se ve reducida la percepción del riesgo y el uso del preservativo.



MOTIVOS POR LOS QUE LOS USUARIOS HAN DECIDIDO HACERSE LA PRUEBA RÁPIDA

Tuve problemas de salud y pensé que podía estar infectado/a	14
Me lo pidió mi pareja	19
Quiero dejar de usar preservativo con mi pareja	15
Pensé que mi pareja podría estar infectada	16
Mantuve sexo ocasional con personas que pensé que podrían estar infectadas	100
Se rompió el preservativo durante la relación sexual	15
Me gusta hacerme un chequeo rutinario	12
He compartido material de inyección	4
Otros motivos	28
NS/NC	20

Resultados de la prueba VIH 2010



Actitud ante el uso del preservativo

Ante un resultado negativo el 77,77% de los usuarios de la prueba manifiesta que seguirá usando el preservativo igual o más que antes.

El 37% de las personas analizadas no comunicaría un resultado positivo en la prueba a nadie.

Conclusiones

Se percibe un aumento de la concienciación en las parejas sobre la infección por VIH, y la responsabilidad sobre la prevención y conocimiento del estado serológico

La información individualizada sobre VIH y prácticas de riesgo promueve y aumenta el uso del preservativo