

Influencia del consumo de tóxicos sobre las conductas sexuales de riesgo en los nuevos diagnósticos de infección por el VIH en 2012

Chamón Parra, María; Pérez Martínez, Raquel; Vera García, Mar; Río Sánchez, Isabel; Paredes Gómez, Vanessa; Villa Escamilla, María; Grau Pérez, Mercè; Calzas del Pino, Isabel; Rodríguez Martín, Carmen; Del Romero Guerrero, Jorge
 Centro Sanitario Sandoval, Dirección Asistencial Centro. Comunidad de Madrid. Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos (IdISSC).

OBJETIVOS

Analizar en pacientes recién diagnosticados de infección por el VIH la influencia del **consumo de diferentes tóxicos** sobre:

1. Las **conductas sexuales de riesgo**.
2. La presencia de **ITS anteriores y concomitantes** al diagnóstico de infección por el VIH.

MATERIAL Y MÉTODOS


- Estudio descriptivo transversal observacional.
- Se incluyeron 277 pacientes diagnosticados de infección por el VIH en 2012 en el Centro Sandoval.
- Se utilizó un cuestionario epidemiológico estructurado para recoger la información sobre el consumo de drogas y las prácticas sexuales de riesgo.
- Se realizó un estudio de la situación clínica respecto al VIH (CD4, carga viral) y despistaje de otras ITS en función de las prácticas sexuales no protegidas.

RESULTADOS


Perfil socio-demográfico

- 96% Varones
- 94% Homo/bisexuales
- Mediana de edad: 32 años
- 48% Entre 25-34 años
- 62% Españoles
- 85% Estudios medios o superiores


CONSUMO DE DROGAS NO INYECTADAS



PRÁCTICAS SEXUALES DE RIESGO BAJO EL EFECTO DE LAS DROGAS



INFLUENCIA DEL CONSUMO DE TÓXICOS SOBRE LAS PRÁCTICAS SEXUALES DE RIESGO



De los pacientes con antecedentes de ITS (67%) el **80%** consumía tóxicos.

De los pacientes con otra ITS concomitante al diagnóstico del VIH (43%) el **85%** consumía tóxicos.

El consumo de las drogas analizadas se relaciona de forma directa con las prácticas sexuales desprotegidas a excepción del **cannabis**.

CONCLUSIONES

- El consumo de tóxicos es un importante factor asociado a las prácticas sexuales desprotegidas.
- El consejo preventivo de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH, debe integrar tanto la educación sexual como el diagnóstico y el tratamiento del consumo de drogas.