

# VIIH Y TUBERCULOSIS

#DiaMundialDeLaTuberculosis



**Las bacterias de la tuberculosis se transmiten de una persona a otra por el aire.**

**Estas bacterias se liberan al aire cuando una persona con esta enfermedad tose, estornuda, habla o canta.**

**La tuberculosis **NO** se transmite:**

- **Dando la mano.**
- **Compartiendo alimentos o bebidas.**
- **Tocando la ropa de cama o inodoros.**
- **Compartiendo el cepillo de dientes.**
- **Con besos.**

**UNA PERSONA CON INFECCIÓN DE  
TUBERCULOSIS LATENTE NO TRATADA  
E INFECCIÓN POR EL VIH  
TIENE MUCHAS MÁS PROBABILIDADES  
DE PRESENTAR ENFERMEDAD DE  
TUBERCULOSIS EN EL TRANSCURSO  
DE SU VIDA QUE ALGUIEN QUE NO  
TIENE INFECCIÓN POR EL VIH.**

**Afortunadamente, hay varios tratamientos eficaces para personas con VIH y una infección de tuberculosis latente o enfermedad de tuberculosis.**

**1º** Hay que asegurarse de que la persona con VIH se haga pruebas para detectar la infección de tuberculosis.

**Si tuviese infección, habrá que hacer más pruebas para descartar la enfermedad de tuberculosis.**

**2º** Comenzar el tratamiento contra la infección de tuberculosis latente o la enfermedad de tuberculosis según los resultados de las pruebas.